

X1-063 (2009/10/29)

# انرژی ی درونی ی یک گاز کامل نسبیتی

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

بسته گی ی انرژی ی درونی ی یک گاز کامل تک اتمی ی کلاسیک نسبیتی به دما محاسبه میشود.

## 1 انرژی و همپارش

یک گاز کامل از ملکولها یی تک اتمی هر یک به جرم  $m$  را در نظر بگیرید. انرژی ی هر ملکول

$$h = \sqrt{c^2 \mathbf{p} \cdot \mathbf{p} + m^2 c^4} \quad (1)$$

است، که  $\mathbf{p}$  تکانه ی ملکول است. انرژی ی کل گاز

$$\begin{aligned} H &= \sum_a h_a, \\ &= h(\mathbf{p}_a), \end{aligned} \quad (2)$$

است، که  $a$  شاخص ذره است. قضیه ی همپارش (مثلن [1]) میگوید

$$\left\langle x^i \frac{\partial H}{\partial x^j} \right\rangle = k_B T \delta_j^i, \quad (3)$$

انرژی ی درونی ی یک گاز کامل نسبیتی

که  $T$  دما ی مطلق است. از اینجا نتیجه میشود

$$\left\langle \frac{c^2 \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{p}_a}{\sqrt{c^2 \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{p}_a + m^2 c^4}} \right\rangle = D k_B T, \quad (4)$$

یا،

$$\left\langle h_a - \frac{m^2 c^4}{h_a} \right\rangle = D k_B T, \quad (5)$$

که  $D$  بُعد فضا است. البته مقدار چشمداشتیها ی طرف چپ معادله ی بالا به شاخص  $a$  بسته گی ندارند و میشود این شاخص را از آن معادله برداشت. با تعریفها ی

$$x := \frac{m c^2}{k_B T}, \quad (6)$$

$$Y := \left\langle \frac{h}{m c^2} \right\rangle, \quad (7)$$

$$Z := \left\langle \frac{m c^2}{h} \right\rangle, \quad (8)$$

معادله ی (5) میشود

$$Y - Z = \frac{D}{x}. \quad (9)$$

## 2 مقدار چشمداشتی ی عکس همیلتنی

برای سیستم ی با همیلتنی ی  $H$  داریم

$$\left\langle \frac{1}{H} \right\rangle = \left[ \int d_P V \exp(-\beta H) \right]^{-1} \int d_P V \frac{1}{H} \exp(-\beta H), \quad (10)$$

که انتگرالگیری روی فضا ی فاز است و

$$\beta := \frac{1}{k_B T}. \quad (11)$$

از (10) نتیجه میشود

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\beta} \left\langle \frac{1}{H} \right\rangle &= - \left[ \int d_P V \exp(-\beta H) \right]^{-1} \int d_P V \exp(-\beta H) \\ &+ \left[ \int d_P V \exp(-\beta H) \right]^{-2} \int d_P V H \exp(-\beta H) \\ &\times \int d_P V \frac{1}{H} \exp(-\beta H) \end{aligned} \quad (12)$$

که نتیجه میدهد

$$\frac{d}{d\beta} \left\langle \frac{1}{H} \right\rangle = -1 + \left\langle \frac{1}{H} \right\rangle \langle H \rangle. \quad (13)$$

به ساده‌گی دیده میشود برای گازها ی کامل نتیجه ی مشابه ی برای همیلتنی ی تکذره‌ای برقرار است:

$$\frac{d}{d\beta} \left\langle \frac{1}{h} \right\rangle = -1 + \left\langle \frac{1}{h} \right\rangle \langle h \rangle, \quad (14)$$

یا بر حسب متغیرها ی بیعد،

$$\frac{dZ}{dx} = -1 + ZY. \quad (15)$$

این معادله همراه با معادله ی (9) بسته‌گی ی انرژی ی درونی به دما را میدهد.  $x$  و  $Y$  و  $Z$  هر سه نامنفی اند.  $Y$  را بین (9) و (15) حذف میکنیم:

$$\frac{dZ}{dx} = -1 + Z \left( Z + \frac{D}{x} \right). \quad (16)$$

صفرها ی طرف راست این معادله را با  $\zeta_1$  و  $\zeta_2$  نشان میدهم:

$$\zeta_1(x) := -\frac{D}{2x} + \sqrt{1 + \frac{D^2}{4x^2}}, \quad (17)$$

$$\zeta_2(x) := -\frac{D}{2x} - \sqrt{1 + \frac{D^2}{4x^2}}. \quad (18)$$

دیده میشود  $\zeta_1$  و  $\zeta_2$  هردو اکیدن صعودی اند. از اینجا معلوم میشود تقاطع خم  $Z$  با هر یک از خمها ی  $\zeta_1$  و  $\zeta_2$  در دستبالاتا یک نقطه (جز 0) است. علت این است که اگر خم  $Z$  خم  $\zeta_i$  را در  $x_0 \neq 0$  قطع کند، مشتق  $(Z - \zeta_i)$  در  $x_0$  منفی میشود. این یعنی یک همسایه‌گی ی  $x_0$  هست که در آن همسایه‌گی، طرف چپ  $x_0$  مقدار  $(Z - \zeta_i)$  مثبت و طرف راست  $x_0$  مقدار  $(Z - \zeta_i)$  منفی

انرژی ی درونی ی یک گاز کامل نسبیتی

است. از اینجا معلوم میشود بین هر دو صفر  $(Z - \zeta_i)$  که 0 نباشند، یک صفر دیگر  $(Z - \zeta_i)$  هست. پس  $(Z - \zeta_i)$  اگر دستکم دو جا (جز 0) صفر شود همه جا صفر میشود. این یعنی  $\zeta_i$  یک جواب (16) است. جاگذاری ی مستقیم نشان میدهد چنین نیست. پس  $(Z - \zeta_i)$  دستبالاتا یک جا (جز 0) صفر میشود.

همچنین، میشود نشان داد اگر  $Z(x_1)$  کوچکتر از  $\zeta_1(x_1)$  باشد، آنگاه یک  $x_2$  هست که در  $x_2 > x_1$  مقدار  $Z$  منفی است. برای اثبات دو حالت در نظر میگیریم. حالت اول این است که  $(Z - \zeta_2)$  در  $x_3$  صفر شود. در این صورت در  $x > x_3$  مقدار  $Z$  کوچکتر از مقدار  $\zeta_2$  و در نتیجه منفی است. پس  $x_2$  را میشود هم ان  $x_3$  گرفت. حالت دوم این است  $(Z - \zeta_2)$  صفر نشود. در این صورت  $Z$  نزولی است (برای  $x > x_1$ ). پس  $Z$  یا منفی نمیشود یا اگر منفی شد با افزایش  $x$  همچنان منفی میماند. اگر  $Z$  منفی نشود،

$$\frac{dZ}{dx} \leq -[\zeta_1(x_1) - Z(x_1)], \quad x > x_1, \quad (19)$$

که نتیجه میدهد فرض نامنفیماندن  $Z$  نادرست است.

پس جواب موردنظر برای معادله ی (16) همواره ناکوچکتر از  $\zeta_1$  است. همه ی این جوابها اکیدن صعودی اند. نشان میدهم از بین جوابها ی همهجا ناکوچکتر از  $\zeta_1$  فقط یک ی هست که در  $x \rightarrow \infty$  بینهایت نمیشود، و آن جواب کوچکترین جواب از بین جوابها ی همهجا ناکوچکتر از  $\zeta_1$  است. اول توجه کنیم که اگر  $Z(x_1)$  بزرگتر از 1 باشد،

$$\frac{dZ}{dx} \geq [Z(x_1) - 1], \quad x > x_1, \quad (20)$$

که نتیجه میدهد  $Z$  در  $x \rightarrow \infty$  بینهایت میشود. حالا دو جواب  $Z_1$  و  $Z_2$  با  $Z_1(x_1) < Z_2(x_1)$  را در نظر بگیریم. برای  $x > x_1$  مقدار  $Z_2$  بزرگتر از مقدار  $Z_1$  است (چون خها ی متناظر با دو جواب متمایز (16) یکدیگر را قطع نمیکنند، جز احتمالن در مبدئ). به این ترتیب،

$$\frac{d(Z_2 - Z_1)}{dx} \geq 0, \quad x > x_1, \quad (21)$$

که نتیجه میدهد

$$Z_2(x) - Z_1(x) \geq Z_2(x_1) - Z_1(x_1), \quad x > x_1, \quad (22)$$

و از آنجا

$$Z_2(x) - \zeta_1(x) \geq Z_2(x_1) - Z_1(x_1), \quad x > x_1. \quad (23)$$

پس چون  $\zeta_1$  در  $x \rightarrow \infty$  به 1 میگراید، یک  $x_2$  هست که در  $x > x_2$  مقدار  $Z_2$  بزرگتر از 1 میشود. پس دو جواب متمایزِ ناکوچکتر از  $\zeta_1$  نیست که هیچ یک در  $x \rightarrow \infty$  بینهایت نشود. روشن است که آن جواب که ناکوچکتر از  $\zeta_1$  است و در  $x \rightarrow \infty$  بینهایت نمیشود، در  $x \rightarrow \infty$  به 1 میگراید.

### 3 رفتارهای مجانبی

رفتارهای جوابِ معادله ی (16) در  $x$  های کوچک و بزرگ را بررسی میکنیم. انتظار میرود  $x$  های کوچک (دماها ی بزرگ) متناظر با رفتارِ فرانسیتی و  $x$  های بزرگ (دماها ی کوچک) متناظر با رفتارِ غیرنسیتی باشند.

با تغییرمتغیر

$$Z(x) =: x^D u(x), \quad (24)$$

معادله ی (16) میشود

$$x^D \frac{du}{dx} = -1 + x^{2D} u^2. \quad (25)$$

اساس کار برای بررسی رفتارِ جواب، مقایسه ی دوجمله ی طرفِ راستِ رابطه ی بالا برای محاسبه ی  $u_0$ ، و سپس یک روشِ اختلال برای محاسبه ی  $u_n$  است، که  $u_n$  بخش ی از  $u$  است که جمله های از مرتبه ی  $n$  یا کمتر را در بردارد.

#### 3.1 $x$ های کوچک

فرض کنید جمله ی غالبِ طرفِ راستِ (25) جمله ی اول است. در این صورت با چشمپوشی از جمله ی دوم نتیجه میشود

$$u_0 = \begin{cases} -\ln x, & D = 1 \\ \frac{x^{1-D}}{D-1}, & D > 1 \end{cases}. \quad (26)$$

انرژی ی درونی ی یک گاز کامل نسبیتی

دیده میشود این شکل  $u_0$  با فرض غالببودن جمله ی اول طرف راست (25) سازگار است. حالا فرض کنید جمله ی غالب در طرف راست (25) جمله ی دوم است. در این صورت با چشمپوشی از جمله ی اول نتیجه میشود

$$u_0 = -(D+1)x^{-(D+1)}, \quad (27)$$

؛ که این هم با فرض غالببودن جمله ی دوم طرف راست (25) سازگار است. سرانجام، فرض کنید جمله ها ی طرف راست (25) هممرتبه اند. در این صورت

$$u_0 \sim x^{-D}, \quad (28)$$

که نتیجه میدهد

$$\frac{du_0}{dx} \sim x^{-(D+1)}, \quad (29)$$

که نشان میدهد (28) با معادله ی (25) ناسازگار است، چون مرتبه ی طرف چپ این معادله را بزرگتر از مرتبه ی طرف راست آن میکند.

پس جمله ی غالب  $u$  به یکی از شکلهای (26) یا (27) است. بین این دو شکل هم آن که با نامنفی بودن  $Z$  سازگار است (26) است.

با یک روش تکرار میشود تصحیحا ی بعدی بر  $u$  را به دست آورد. رابطه ی بازگشتی برای  $u_n$

$$x^D \frac{du_n}{dx} \stackrel{n}{=} -1 + x^{2D} (u_{n-1})^2 \quad (30)$$

است، که معنی ی شاخص  $n$  روی تساوی این است که این تساوی فقط تا مرتبه ی  $n$  درست است. در انتگرالگیری از (30) یک ثابت دلخواه هم ظاهر میشود (که قاعدتن از این شرط تعیین میشود که  $Z$  در  $\infty \rightarrow x$  به 1 میگراید). اما این ثابت را فقط از جایی باید نگه داشت که جمله های کوچکتر از یا هممرتبه با آن چه ناشی از این ثابت است ظاهر شوند. به این ترتیب جمله های  $u$  در  $n$  که متناسب با توانها ی منفی ی یا لگاریتم  $x$  اند، بدون استفاده از شرط مرزی ی  $\infty \rightarrow x$  به دست می آیند. اما جمله های متناسب با توانها ی مثبت  $x$  یا توانها ی مثبت  $x$  ضرب در لگاریتم  $x$  نه. مثلاً  $u_1$  را در

نظر بگیرید. از (30) نتیجه میشود

$$u_1 = u_0 + \begin{cases} C, & D < 3 \\ \frac{1}{4} \ln x, & D = 3, \\ -\frac{x^{3-D}}{(D-3)(D-1)^2}, & D > 3 \end{cases} \quad (31)$$

که  $C$  یک ثابت است که از شرط مرزی در  $x \rightarrow \infty$  به دست می‌آید. با ادامه‌ی روش تکرار برای محاسبه‌ی تصحیحات بعدی، دیده میشود

$$u_n = \begin{cases} \sum_{k=0}^n c_k x^{2k+1-D}, & n < \frac{D-1}{2} \\ \sum_{k=0}^{n-1} c_k x^{2k+1-D} + c \ln x, & n = \frac{D-1}{2} \end{cases} \quad (32)$$

برای  $n$  های بزرگتر، در  $u_n$  جمله‌هایی با توانهای مثبت  $x$  ظاهر میشود که ضریبهایشان با شرط مرزی در  $x \rightarrow \infty$  به دست می‌آید. دیده میشود به هر حال جمله‌ی لگاریتمی فقط در بدهای فرد ظاهر میشود.

### 3.2 $x$ های بزرگ

از این که جواب موردنظر برای معادله‌ی (16)، در  $x \rightarrow \infty$  به 0 می‌گراید نتیجه میشود

$$u_0 = x^{-D}. \quad (33)$$

در این حالت در (25) نسبت طرف چپ به هر یک از جمله‌های طرف راست، در  $x \rightarrow \infty$  به صفر می‌گراید. به این ترتیب رابطه‌ی بازگشتی برای  $u_n$  میشود

$$u_n = x^{-D} \sqrt{1 + x^D \frac{du_{n-1}}{dx}}. \quad (34)$$

جواب این همراه با (33) به شکل

$$u_n = \sum_{k=0}^n d_k x^{-k-D} \quad (35)$$

است، از جمله

$$u_2 = x^{-D} - \frac{D x^{-1-D}}{2} + \frac{D(D+2)x^{-2-D}}{8}. \quad (36)$$

### 3.3 رفتار مجانبی انرژی

از ترکیب نتایج بالا با (9) و (24) نتیجه میشود

$$Y_1(x) = \begin{cases} x^{-1} - x \ln x, & D = 1 \\ D x^{-1} + \frac{x}{D-1}, & D > 1 \end{cases}, \quad x \ll 1, \quad (37)$$

و

$$Y_2(x) = 1 + \frac{D x^{-1}}{2} + \frac{D(D+2)x^{-2}}{8}, \quad x \gg 1. \quad (38)$$

### 4 شکل بسته برای انرژی

داریم

$$Z(x) = -\frac{W(x)}{W'(x)}, \quad (39)$$

که

$$W(x) := \int_0^\infty d\xi \frac{\xi^{D-1}}{\sqrt{1+\xi^2}} \exp(-x \sqrt{1+\xi^2}). \quad (40)$$

داریم

$$\begin{aligned} x^2 \left( \frac{d^2 W}{dx^2} - W \right) &= \int_0^\infty d\xi x^2 \frac{\xi^{D+1}}{\sqrt{1+\xi^2}} \exp(-x \sqrt{1+\xi^2}), \\ &= \int_0^\infty d\xi D x \xi^{D-1} \exp(-x \sqrt{1+\xi^2}), \\ &= -D x \frac{dW}{dx}, \end{aligned} \quad (41)$$

که نتیجه میدهد

$$\left(x^2 \frac{d^2}{dx^2} + D x \frac{d}{dx} - x^2\right) W = 0. \quad (42)$$

با تغییر متغیر

$$W(x) =: x^{-m} X(x), \quad (43)$$

با

$$m := \frac{D-1}{2}, \quad (44)$$

نتیجه میشود

$$\left[x^2 \frac{d^2}{dx^2} + x \frac{d}{dx} - (x^2 + m^2)\right] X = 0, \quad (45)$$

که معادله ی بسل [2] دگرگون است. از این معادله همراه با این شرط مرزی که  $W$  و در نتیجه  $X$  در  $x \rightarrow \infty$  به 0 میگراید نتیجه میشود

$$X(x) = N K_m(x), \quad (46)$$

که  $N$  ثابت و  $K_m$  تابع بسل [2] دگرگون از نوع دوم از مرتبه  $m$  است. به این ترتیب،

$$W(x) = N x^{-m} K_m(x). \quad (47)$$

این نتیجه را در [3] هم میشود یافت. از (47) نتیجه میشود

$$Z(x) = \frac{x K_m(x)}{m K_m(x) - x K'_m(x)}, \quad (48)$$

و از آنجا

$$Y(x) = \frac{D}{x} + \frac{x K_{(D-1)/2}(x)}{[(D-1)/2] K_{(D-1)/2}(x) - x K'_{(D-1)/2}(x)}. \quad (49)$$

با بسط دادن این عبارت در  $x$  های کوچک و بزرگ، از جمله میشود رابطه های (37) و (38) را باز یافت.

## ۵ پانوشتها

- [1] R. K. Pathria; “Statistical Mechanics” (Pergamon Press, 1993) chapter 2
- [2] Bessel
- [3] I. S. Gradshteyn & I. M. Ryzhik; “Table of integrals, series, and products”  
7th edition (Academic Press, 2007) section 3.387